

فاویسم چیست؟

فاویسم یک بیماری فصلی، ارثی و تغذیه ای است که به شکل کم خونی و بیشتر در اثر خوردن باقلای سبز و گاهی فریز شده و یا در اثر مصرف برخی داروها و مواد شیمیایی اکسید کننده در افراد حساس اتفاق می افتد.

علت بیماری

در صورتی که آنزیم (جی سیکس پی دی) در بدن کم باشد فرد در مقابل بعضی از داروها و باقلا حساس شده و گلوبول های قرمز وی شکسته و باعث کم خونی و پر رنگ شدن ادرار می شود.

علائم

24 تا 48 ساعت پس از خوردن باقلا یا مصرف بعضی از داروهای خاص کودک دچار علائم زیر می شود:

- کم خونی شدید
- استفراغ و تهوع
- زردی سفیده چشم
- زردی پوست
- خونی شدن رنگ ادرار (به رنگ کوکا یا چای پررنگ)
- افزایش ضربان قلب، تنفس کوتاه
- بی حالی و احساس خستگی

سرم در مانی:

یکی از عوارض این بیماری ایجاد مشکلات کلیوی می باشد در نتیجه کودک باید سرم دریافت کند تا کلیه های وی صدمه نبیند.

تزریق خون:

در صورت کم خون شدن کودک، نیاز به تزریق خون می باشد.

- باید سطح خون مرتبا با انجام آزمایش خون بررسی شود.
- همچنین باید در مدت بستری ادرار کودک به طور سربال در لیوان یکبار مصرف جمع آوری شود تا متوجه تغییر رنگ ادرار شویم.

آموزش های خود مراقبتی

- شناخت عواملی که موجب بروز حملات بیماری می شوند و پرهیز از مواجهه با آنها، یعنی اگر کودک در مواجهه با بوی باقلا دچار بیماری می شود از قرار گرفتن در مکان هایی که بوی باقلا استشمام می شود (مزارع باقلا) اجتناب کند.
- استفاده از هر گونه باقلا (خام، پخته، تازه، خشک شده یا یخ زده) ممنوع است.
- در صورت مراجعه به پزشک و یا مراکز درمانی ابتلا به فاویسم را اعلام کنید تا داروهای بی خطر برای فرزندتان تجویز شود.



در بیماری یرقان، رنگ پوست و سفیده چشم بیمار زرد می شود

درمان

در تمام موارد خفیف و شدید کودک باید بستری گردد بدلیل اینکه از اورژانس های اطفال می باشد. در این بیماری کودک باید در بیمارستان بررسی شود و درمان های لازم برای وی انجام شود که شامل:





بیمارستان حضرت محمد رسول الله (ص) مبارکه

فاویسم



گروه هدف: بیماران

تهیه و تنظیم: خانم شمس (کارشناس پرستاری)

واحد آموزش همگانی: تلفن 52672222 داخلی 314

کد محتوا: GH1402253

سایت اینترنتی بیمارستان: www.mrhos.mui.ac.ir

داروهای ضد کرم

بناتفنول استیبوفن نیریدازول

سایر داروها

استانیلید آنالوگ های ویتامین K متیلن بلو

پروبنسید استیل سالیسیلیک اسید

فنازوپیریدین

دیمرکاپرول تولوئیدین بلو راسبوریکاز

مواد شیمیایی

فنیل هیدرازین بنزن نفتالین

2و4و6- تری نیتروتولون

بیماری

اسیدوز دیابتی هیپاتیت سپسیس (عفونت خون)

منبع: کتاب اورژانس های اطفال (CMMD)

منبع دارویی: نلسون 2020

مشاور علمی: آقای دکتر کاووس کفاشان
(متخصص اطفال و نوزادان)

➤ در صورت بروز حمله فاویسم به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمائید.

➤ اگر به کودک فاویسمی خود شیرمی دهید، شما هم باید از مصرف باقلا خودداری کنید.

➤ باید کاملا با نام داروهایی که باعث فاویسم می شوند آگاهی داشته باشید، برای این کار توصیه می شود لیست داروها را دانسته و در صورت مراجعه به پزشک یاد آور شوید که فرزندتان به فاویسم مبتلا می باشد. داروهایی که این کودکان نباید استفاده کنند شامل:

داروهای آنتی باکتریال داروهای ضد مالاریا

سولفا نامیدها پریماکین

دایسون پاماکین

تری متوپریم - سولفامتوکسازول کلروکین

نالیدیکسیک اسید کیناکرین

کلرامفنیکل

نیترو فورانتوئین

سیپروفلوکساسین

موکسی فلوکساسین

نورفلوکساسین

ا فلوکساسین