

حاملگی خارج رحمی

حاملگی خارج از رحم به حالتی گفته می شود که تخمک لقاح یافته در جایی به غیر از دیواره داخلی رحم مستقر می شود و شروع به رشد می کند. ۹۸ درصد حاملگی های خارج از رحم درون لوله های فالوپ (لوله رحمی) اتفاق می افتد ، با این حال امکان دارد در نقاط دیگری مثل تخمدان ، گردن رحم و حفره شکمی نیز رخ دهد.

علائم بارداری خارج رحمی

- خونریزی واژینال یا لکه بینی

- آمنوره یا عدم قاعدگی

- تهوع

- استفراغ

- درد در ناحیه شکم

- گرفتگی عضلات

- احساس درد تنهادر یک طرف بدن

- سرگیجه

- ضعف

- غش کردن

- درد در ناحیه مقعد

- درد در ناحیه گردن یا شانه

عوامل خطر

✓ بارداری بعد از بستن لوله ها(یک جراحی برای جلوگیری

از بارداری دائم)

✓ سابقه بارداری خارج رحمی

✓ بیماریهای مقاربتی

✓ بیماری های التهابی لگن

✓ لوله های فالوپ آسیب دیده

✓ مصرف داروهای ضد بارداری

✓ باردار شدن به روش های آزمایشگاهی (لقاح

آزمایشگاهی)

✓ عمل جراحی لگن

✓ استفاده از آیو دی تقریباً ۵۰ درصد بارداری زنانی که برای

جلوگیری از بارداری از آیو دی استفاده می کنند خارج

از رحم صورت می پذیرد.

تشخیص

آزمایش خون و اندازه گیری مقدار HCG در خون در یک بارداری طبیعی مقدار گنادوتروپین جفتی انسانی HCG به سرعت افزایش می یابد و اگر سطح HCG آن طور که انتظار می رود افزایش نیابد به وجود نوعی بارداری غیرطبیعی مشکوک می شویم . در صورت وجود بارداری خارج رحمی ممکن است سطح HCG افزایش یابد ولی در سونوگرافی هیچ نشانه ای مبنی بر بارداری درون رحم دیده نمی شود.

معاینه ی داخلی از طریق واژن احتمالاً دهانه رحم بسیار دردناک بوده و ممکن است در معاینه توده ای در ناحیه لوله ها و خارج از رحم لمس شود.

سونوگرافی راه خوبی برای تشخیص بارداری خارج رحمی

است.ممكن است با سونوگرافی بتوان بارداری لوله ای را درون لوله فالوپ مشاهده کرد.پزشک ممکن است به دلیل پارگی لوله یا خونریزی مقداری خون در حفره شکم ببیند و یا توده ای در ناحیه لوله فالوپ یا تخمدان قابل مشاهده باشد.



بیمارستان حضرت محمد رسول... (ص) مبارکه

درمان

در صورتی که بارداری خارج از رحم زود تشخیص داده شود از داروی متوتروکسات استفاده می شود. متوتروکسات یک داروی ضد سرطان است که به صورت وریدی تزریق می گردد. و ارزش سلول ها جلوگیری می نماید و سلول های موجود را در طول زمان ، در بدن شما حل می کند. هنگامی که سطح هورمون بارداری پایین باشد و جنین دارای هیچ گونه فعالیت قلبی نباشد.

جراحی

در صورتی که بارداری خارج از رحمی باعث ایجاد علائم شدید از جمله خونریزی یا بالا رفتن میزان هورمون بارداری گردد جراحی مورد نیاز است. پارگی لوله ها با گذر زمان احتمالاً بیشتر می شود و به همین دلیل درمان دارویی نتیجه نخواهد داد. در صورتی که بارداری خارج از رحمی موجب پارگی گردد عمل جراحی باید به صورت اورژانسی انجام گیرد.

اگر شما در شرایط ثابت قرار دارید و جنین نیز به اندازه ی کافی کوچک است می توان از طریق لاپاروسکوپی آن را از بین برد. در این روش با استفاده از یک لوله مجهز به دوربین بسیار کوچک بر روی شکم وارد بدن می شود می توان بافت های نا به جا را حذف و لوله های فالوپ آسیب دیده را ترمیم نمود. در صورتی که لوله های فالوپ، آسیب قابل توجهی پیدا کرده باشند معمولاً برداشتن آنها ضروری است. در مواردی پس از عمل جراحی نیاز به تزریق متوتروکسات است.



حاملگی خارج رحمی

منابع: کتاب ویلیامز بیماری های زنان برک و نوآک- جلد دوم- (جاناتان اس برک و همکاران)
مشاور علمی: خانم دکتر پروین صالحی (متخصص زنان)

حاملگی خارج از رحم

(EP)

گروه هدف: بیماران

تهیه و تنظیم: خانم رحمانی (کارشناس مامائی)

واحد آموزش همگانی: تلفن ۵۲۶۷۲۲۲۲ داخلی ۳۱۴

کد محتوا: ۱۹۷۲۰۱

سایت اینترنتی بیمارستان www.mrhos.mui.ac.ir