

تعریف:

دیلاتاسیون و کورتاژ (D&C) به معنی نمونه گیری از دیواره داخلی رحم می باشد.

دیلاتاسیون: باز کردن بخش پایین رحم که دهانه رحم نامیده می شود

کورتاژ: به معنی تراشیدن و بیرون آوردن بافت دیواره داخلی رحم (آندومتر) می باشد.

این روش به منظور شناسایی علت خون ریزی بی نظم یا زیاد قاعدگی یا درمان سقط ناقص انجام می شود.

دلایل انجام D&C (دیلاتاسیون و کورتاژ):

۱- کورتاژ تشخیصی:

به دست آوردن بافت دیواره رحم و بررسی علت خون ریزی های غیر طبیعی رحم یا مشاهده سلول های آندومتر رحم در نمونه پاپ اسمیر می باشد.

۲- کورتاژ درمانی:

این روش برای تخلیه محتویات رحم در این موارد استفاده می شود:

➤ سقط ناقص:

در مواردی که کلیه محصولات بارداری از رحم تخلیه نشده باشد کورتاژ به منظور تخلیه کامل و پاکسازی انجام می شود.

➤ سقط عمدی:

در صورتی که به دلیلی لازم به ختم بارداری باشد، می توان با استفاده از کورتاژ محصولات بارداری را از رحم تخلیه کرد.

➤ درمان مول:

زمانی که یک توده توموری به جای بارداری طبیعی در رحم رشد کرده باشد حاملگی مولار گفته می شود که در این صورت D&C لازم است انجام گیرد.

➤ خون ریزی های طولانی و زیاد قاعدگی:

زمانی که به هیچ درمان دارویی پاسخ داده نشود D&C نیاز است.

➤ خون ریزی بعد از زایمان:

ممکن است بعد از زایمان طبیعی به علت باقی ماندن بقایای جفت در رحم نیاز به D&C باشد.

چگونه برای انجام D&C آماده شویم؟

➤ ممکن است لازم باشد که قبل از اقدام به D&C آزمایش خون انجام دهید و از نظر وضعیت انعقادی و میزان کم خونی بررسی گردید.

➤ شب قبل از عمل شام سبکی میل کنید و صبح ناشتا برای انجام عمل مراجعه کنید.

➤ در بیمارستان به محض پذیرش برای شما رگ گیری خواهد شد که داروها و مایعات از این طریق به شما داده می شود.

➤ هنگام ترخیص حتما یک نفر همراه داشته باشید چرا که به صلاح شما نیست بعد از بی هوشی رانندگی کنید.



عوارض

به طور کلی این عمل بسیار ایمن و بدون خطر است اما به هرحال مانند هرگونه عمل جراحی دیگر ممکن است با عوارض همراه باشد.

➤ پارگی رحم:

در موارد نادری ممکن است ایجاد شود.



دیلاتاسیون و کورتاژ



گروه هدف: بیماران

تهیه و تنظیم: خانم رضائی (کارشناس مامائی)

واحد آموزش همگانی: تلفن ۰۲۶۷۲۲۲۲ داخلی ۳۱۴

کد محتوا: ۱۹۷۲۰۵

سایت اینترنتی بیمارستان www.mrhos.mui.ac.ir

زمان مناسب برای شروع مقاربت را از پزشک خود سوال کنید.

به خاطر داشته باشید، قاعدگی بعدی شما ۴ تا ۶ هفته بعد از عمل D&C انجام می باشد.

در صورت مشاهده علائم زیر به پزشک مراجعه کنید

۱- تب بیش از ۳۸ درجه

۲- دردهای زیر دل که بیش از ۴۸ ساعت طول کشیده باشد.

۳- خون ریزی طولانی یا خیلی زیاد

۴- ترشحات بودار واژن



منابع: کتاب ویلیامز - سایت دکتر شاهرودی

مشاور علمی: دکتر پروین صالحی (متخصص زنان و زایمان)

➤ آسیب به دهانه رحم:

در حین گشادکردن دهانه برای ورود به رحم اتفاق می افتد

➤ عفونت:

عفونت ناشی از D&C بسیار نادر است مگر در موارد سقط غیر مجاز خارج از بیمارستان

➤ چسبندگی داخل رحم:

در این صورت قاعدگی دردناک نازایی یا سقط مکرر اتفاق می افتد که باید درمان دارویی یا جراحی انجام شود.

مراقبت های لازم در منزل

بعد از بازگشت به منزل باید بتوانید کارهای روزمره خود را انجام دهید.

ممکن است درد خفیفی در زیر دل داشته باشید که به تدریج بعد از ۲ روز قطع می شود و با مسکن به سادگی تسکین داده می شود.