

اریتروپویتین چیست؟

اریتروپویتین یک ماده ای است که تولید گلبولهای

قرمز را تحریک می کند. این هورمون در کلیه

ساخته می شود .



موارد مصرف

بر طرف کردن اختلالات پلاکتی و اختلالات جنسی و

متا بولیکی موثر است.

روش مصرف

دارو به صورت وریدی استفاده می شود.

افزایش میزان هماتو کریت بسته به مسیر تجویز دارو

و مقدار تجویز شده دارو دارد. تزریق زیرجلدی آن

موثر تر از وریدی آن می باشد.

موارد منع مصرف دارو

۱- افزایش فشار خون کنترل نشده

۲- حساسیت مفرط به فرآورده های ناشی از آلبومین

انسانی

موارد احتیاط:

۱- مادران شیرده

۲- حاملگی (گروه پرخطر)

عوارض جانبی دارو

سردرد , هیپرتانسیون , تهوع , استفراغ ,

اسهال , فقر آهن , افزایش تعداد پلاکت خون

, لخته شدن فیستول

طریقه نگهداری اریتروپویتین در منزل:

۱- دارو را سریعاً به یخچال انتقال دهید در دمای بین ۲-۸

درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

۲- از قرار دادن آمپول در کنار فریزر و کنار یخ ساز

خودداری شود.

۳- از مجاورت در کنار منابع گرمایی و نور خورشید

خودداری کنید.

۴- تا زمانی که دارو استفاده نشده آن را درون جعبه مقوایی

نگه دارید.

۵- اپرکس تا پیش از زمان انقضا قابل استفاده است.

انتقال از داروخانه به منزل

➤ لطفاً از جعبه محل دارو که رایگان در اختیار شما

قرار می گیرد استفاده کنید.

➤ از مجاورت دارو در پشت اتومبیل و برخورد نور

خورشید به آن خودداری کنید.

➤ از نگهداری اپرکس در اتومبیلی که دمای آن بیش از

۲۰ درجه سانتی گراد است خودداری کنید.

در صورت وجود یکی از اختلالات زیر از دارو استفاده نکنید:

❖ کدورت یا رنگی شدن دارو(در حالی که باید دارو شفاف

یا بدون رنگ باشد).



بیمارستان حضرت محمد رسول الله (ص) مبارکه



❖ وجود ذرات معلق یا کف آلود

❖ خاموش شدن یخچال در اثر قطع برق یا خرابی

❖ یخ زدن دارو در اثر سرما زیر صفر یا گرمای ۲۵ درجه

❖ گذشتن تاریخ انقضا

❖ پس از برداشتن از یخچال دستها را با آب و صابون بشویید و با حوله خشک کنید.

❖ صبر کنید و با دقت به تاریخ انقضای آن توجه کنید.

❖ صبر کنید دمای اریتروپویتین با دمای اتاق یکسان شود.

❖ در مدتی که بیرون از یخچال است از مجاورت نور و گرمای شدید خودداری شود. این زمان نباید ۱۵ الی ۳۰ دقیقه طول بکشد.

❖ از گرم کردن سریع تر از ۱۵ الی ۳۰ دقیقه خودداری کنید.

❖ از گرم کردن آمپول بصورت مالشی شدید در بین دو دست خودداری کنید.

❖ از گرم کردن توسط ماکروویو، فر معمولی و آب گرم خودداری کنید.

❖ آمپول اریتروپویتین را طبق نسخه پزشک استفاده کنید.

توجه

اگر مقدار اریتروپویتین که دریافت می کنید زیاد باشد هفته ای یکبار همو گلوبین کنترل شود. ولی اگر کم یا نگهدارنده باشد هفته ای یک عدد یا دو عدد همو گلوبین باید ماهی یکبار چک شود.

آمپول اریتروپویتین و طریقه نگهداری از آن

گروه هدف: بیماران

تهیه و تنظیم: خانم محمودی (کارشناس پرستاری)

واحد آموزش همگانی: تلفن ۵۲۶۷۲۲۲۲ داخلی ۳۱۴

کد محتوا: K۹۸۱۰۶

سایت اینترنتی بیمارستان: www.mrhos.mui.ac.ir

منبع: پرستاری در دیالیز

مشاور علمی: دکتر هنگامه جمشیدی

(فوق تخصص نفرولوژی)